Название учреждения
№ _____ от «___» _____ 20___ г.

Стандартная операционная процедура (СОП)

Текущая дезинфекция в операционной

Введена в действие:
Срок действия:

	Должность	**Ф. И. О.**	**Подпись**	**Дата**
Утвердил:	Главный врач			
Разработал:	Главная медицинская сестра			
Рассылка:	Все структурные отделения			
Изменение:				
Место хранения:	операционная			
Количество экземпляров:				
Согласование:	Заведующие профильными отделениями			
Согласование:				

Цель внедрения

Снижение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, путем надлежащего проведения текущей дезинфекции в операционной.

Нормативная документация
1. Федеральные и региональные нормативные документы:

Федеральные и региональные нормативные документы:

- Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- СанПиН 3.3686 – 21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- СанПиН 2.1.3684 – 21 «Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- МУ 3.5.1.3674 – 20 «Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи»;

- Р3.5.1904 от 2004 года «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях».
- Другие документы.

2. Локальные организационно-распорядительные документы.

Оснащение

1. Уборочный инвентарь (емкость, ведро, швабра).

2. Ветошь.

3. Дезинфицирующее средство.

4. Инструкция по применению дезинфицирующего средства.

5. Средства индивидуальной защиты.

6. Предупреждающие знаки.

7. Пакеты и емкости для сбора мусора и белья.

Термины и определения, сокращения

СОП – стандартная операционная процедура.

Текущая уборка – комплекс мероприятий, которые направлены на эффективное и своевременное устранение загрязнений всех типов в рамках помещения и проводятся два раза в сутки, а также по мере необходимости в течение рабочего времени.

Дезинфицирующие средства – химические и физические средства, применяемые для уничтожения во внешней среде возбудителей инфекционных заболеваний человека.

Отходы класса А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам.

Отходы класса Б – эпидемиологически опасные отходы. Инфицированные и потенциально
инфицированные отходы (материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями). Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и т. д.).

СИЗ – средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, колпаки).

ИМН – изделия медицинского назначения

Алгоритм выполнения

Правила проведения текущей уборки

1. Текущая уборка осуществляется систематически с целью удаления загрязнений, снижения микробной контаминации объектов и предупреждения возможности размножения микроорганизмов.

2. Текущую уборку проводят не реже 2 раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств, с последующим обеззараживанием воздуха при помощи разрешенных для этих целей оборудования, и проветриванием.

3. Текущая уборка проводится с применением спецодежды: халата, шапочки и средств индивидуальной защиты (перчаток, маски). Смена спецодежды осуществляется ежедневно.

4. Текущие уборки в помещениях проводят по вирусному режиму, выбор режима дезинфекции проводят по наиболее устойчивым микроорганизмам с учетом функционального назначения помещений.

5. При обеззараживании объектов, загрязненных кровью и другими биологическими субстратами, следует применять дезинфицирующие средства по противовирусному режиму.

6. Обеззараживание воздуха проводят согласно инструкции по применяемому оборудованию , установленного в помещении.

7. Концентрация рабочего дезинфицирующего раствора применяется согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства.

8. Для приготовления рабочих дез. растворов из концентратов необходимо иметь мерную емкость с градуированной отметкой. Вскрытые емкости с дез. растворами (таблетками и концентратами) необходимо плотно закрывать крышками во избежание испарения дезинфицирующих средств и недопущения вдыхания паров, содержащих активные вещества дезинфицирующих средств в повышенных концентрациях.

9. Для предотвращения контаминации возбудителями ИСМП дезинфицирующих растворов их многократное использование для медицинских изделий допускается в течение рабочей смены, если их внешний вид не изменился (включая мутность, хлопья, осадок, изменение цвета) вне зависимости от наличия рекомендаций по срокам использования рабочих растворов дезинфицирующих средств, указанных в инструкциях по их применению.

10. Хранение моющих и дезинфицирующих средств должно осуществляться в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, на стеллажах, в специально предназначенных местах. Не допускать попадания прямых солнечных лучей на дезинфицирующие средства.

11. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств должны иметь четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, экспозиции и росписи сотрудника.

12. После окончания проведения текущей уборки ветошь дезинфицируется в растворе (концентрация и экспозиция – согласно инструкции по применению используемого

дезинфицирующего средства), прополаскивается под проточной водой и высушивается. Швабры и ведра дезинфицируется протираниемконцентрация и экспозиция – согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства и высушиваются.

13. Уборочный инвентарь (емкости, ветошь, швабры, тележки) должен иметь четкую маркировку с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ.

14. Хранение осуществляют в специально выделенном помещении.

15. При истирании маркировки ее необходимо обновлять.

16. Уборочный инвентарь для пола и для стен должен храниться раздельно.

Этапы проведения текущей уборки операционной:

1. Приготовить уборочный инвентарь (ведра, швабры и ветошь) для операционной.

2. Надеть средства индивидуальной защиты для проведения текущей уборки, шапочку, маску, перчатки.

3. Приготовить дез. раствор концентрация согласно инструкции, нанести ветошью приготовленный дез. раствор на все поверхности, объекты, одновременно отмывая поверхности от загрязнений, норма расхода мл на м2 поверхности (смотри инструкцию по применяемому дез. средству).

4. Протирание горизонтальных поверхностей мебели, полок для хранения медикаментов и ИМН, оборудования, аппаратуры, ручек дверей, подоконников.

5. Приготовить необходимые рабочие дез. растворы в концентрациях, соответствующих предназначению; при разведении новой порции дезраствора на бирке необходимо отметить дату и время разведения.

6. Мытье пола.

7. Обеззараживание воздуха проводят согласно инструкции по применяемому оборудованию , установленного в помещении.

8. Проветривание в течение 15-20 минут.

9. Сделать отметку в «Журнале регистрации контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки» о дате и экспозиции во время рабочей смены, при использовании УФО.

10. В операционных между операциями провести текущую дезинфекцию рабочих поверхностей с применением дезинфицирующих средств по режимам, эффективным для профилактики парентеральных вирусных гепатитов.

11. Операционный стол для пациента продезинфицировать способом протирания и накрыть чистой простыней, предпочтительно однократного применения, перед каждой новой операцией.

12. В конце рабочего дня провести дезинфекцию, предстерилизационную очистку и подготовку к стерилизации ИМН многократного применения; с отметкой концентрации дезраствора, даты, времени приготовления, экспозиции и росписи сотрудника, проводившего дезинфекцию.

13. Дезинфекция, и сбор на временное хранение ИМН однократного использования (отходы класса Б);

14. Сбор отходов класса А.

15. Сбор использованного белья.

16. Приготовить дез. раствор концентрация согласно инструкции, нанести ветошью приготовленный дез. раствор на все поверхности, объекты, одновременно отмывая поверхности от загрязнений, норма расхода мл на $м^2$ поверхности (смотри инструкцию по применяемому дез. средству).

17. Протирание горизонтальных поверхностей мебели, полок для хранения медикаментов и ИМН, оборудования, аппаратуры, ручек дверей, подоконников;

18. Мытье пола.

19. После окончания проведения текущей уборки ветошь дезинфицируется в дез. растворе (концентрация и экспозиция – согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства), прополаскивается под проточной водой и высушивается.

20. Швабры и ведра дезинфицируется протиранием концентрация и экспозиция – согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства и высушиваются.

21. Обеззараживание воздуха проводят согласно инструкции по применяемому оборудованию по обеззараживанию воздуха, установленного в помещении.

22. Проветривание в течение 15-20 минут.

23. Сделать отметку в «Журнале регистрации контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки», при использовании УФО.

Перечень объектов, требующих последовательной обработки

1. Рабочие поверхности.

2. Медицинское оборудование согласно паспорту производителя.

3. Все емкости в операционных освобождаются, моются и дезинфицируются способом протирания, освобождается, размораживается и моется холодильник.

4. Стены, зеркала.

5. Осветительные приборы настенные и потолочные.

6. Оборудование по обеззараживанию воздуха.

7. Двери.

8. Отопительные приборы.

9. Подоконники.

10. Раковина, смеситель, кафель вокруг раковины; вентиляционные решетки, трубы.

Индикаторы эффективности

Создание условий для безопасного выполнения операции. Обеспечение санитарно-эпидемиологического режима. Инфекционная безопасность.

Лист ознакомления

№	Ф. И. О.	Должность	Дата	Подпись

Оценочный лист (чек – лист)

Дата «_____»_____20___г

№ п/п	Перечень практических действий	Выполнил	Не выполнил
1.	Приготовить уборочный инвентарь (ведра, швабры и ветошь) для операционной.		
2.	Надеть средства индивидуальной защиты для проведения текущей уборки, шапочку, маску, перчатки.		

3.	Приготовить дезраствор концентрация согласно инструкции.		
4.	Нанести ветошью приготовленный дезраствор на все поверхности, объекты, одновременно отмывая поверхности от загрязнений. Протирание горизонтальных поверхностей мебели, полок для хранения медикаментов и ИМН, оборудования, аппаратуры, ручек дверей, подоконников.		
5.	Приготовить необходимые рабочие дезрастворы в концентрациях, соответствующих предназначению согласно инструкции.		
6.	Отметить дату и время разведения.		
7.	Помыть пол.		
8.	Включить оборудование по обеззараживанию воздуха.		
9.	Проветривание в течение 15-20 минут.		
10.	Сделать отметку в «Журнале регистрации контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки» о дате и экспозиции во время рабочей смены, при использование такового.		
11.	Провести текущую дезинфекцию рабочих поверхностей с применением дезинфицирующих средств по режимам, эффективным для профилактики парентеральных вирусных гепатитов после каждой операции.		
12.	Операционный стол для пациента продезинфицировать способом протирания после каждой операции.		
13.	Накрыть чистой простыней, предпочтительно однократного применения, перед каждой новой операцией.		
14.	Провести дезинфекцию, предстерилизационную очистку и подготовку к стерилизации ИМН многократного применения.		
15.	Отметить экспозицию и роспись сотрудника, проводившего дезинфекцию.		
16.	Дезинфекция, и сбор на временное хранение ИМН однократного использования, использованного материала (отходы класса Б).		
17.	Отметка на бирке экспозици и росписи сотрудника, проводившего дезинфекцию.		

18.	Сбор отходов класса А.		
19.	Сбор использованного белья.		
20.	Приготовить дезраствор концентрация согласно инструкции.		
21.	Нанести ветошью приготовленный дезраствор на все поверхности, объекты, одновременно отмывая поверхности от загрязнений. Протирание горизонтальных поверхностей мебели, полок для хранения медикаментов и ИМН, оборудования, аппаратуры, ручек дверей, подоконников.		
22.	Помыть пол.		
23.	Ветошь продезинфицировать в дезрастворе (концентрация и экспозиция – согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства), прополаскать под проточной водой и высушить.		
24.	Швабры и ведра продезинфицировать способом протирания концентрация и экспозиция – согласно инструкции по применению используемого дезинфицирующего средства и высушить.		
25.	Включить оборудование по обеззараживанию воздуха		
26.	Проветривание в течение 15-20 минут.		
27.	Сделать отметку в «Журнале регистрации контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки» о дате и экспозиции во время рабочей смены, при использование УФО.		

ФИО проверяющего _____ Подпись _____